



# PASADO Y PRESENTE DEL CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA DEFENSA

Cte. Médico D<sup>a</sup> Gloria Gema Cáceres Bermejo  
Cap. Enfermera D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Julia Ajejas Bazán.  
Cte. Médico D<sup>a</sup> Eva Gálvez Pajares.  
Centro de Vacunación del Instituto de Medicina Preventiva.

## INTRODUCCIÓN

Desde su creación en 1885 el Instituto de Medicina Preventiva (IMPDEF) ha experimentado importantes cambios. De la fabricación propia de sueros y vacunas se ha pasado a realizar funciones de Centro de Vacunación Internacional (CVI). Actualmente es el centro de referencia sobre vacunaciones en las Fuerzas Armadas (FAS)

## OBJETIVOS



Describir los acontecimientos más relevantes de la historia del CVI del IMPDEF.  
Describir la actividad asistencial actual del CVI del IMPDEF

## MATERIAL Y MÉTODO

Revisión bibliográfica de las fuentes documentales históricas del IMPDEF. Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad asistencial del CVI del IMPDEF durante 2013. Se han incluido en el estudio la totalidad de los pacientes: personal de las FAS, Guardia Civil y personal civil, atendidos en el CVI durante ese año. Se ha empleado el sistema de información BALMIS para la obtención de datos y para su análisis el sistema SPSS 15.0 para Windows.

## RESULTADOS

En el año 1993 se firma un acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Sanidad para que el IMPDEF realice funciones de CVI. Durante el año 2013 se han administrado 4790 vacunas (70% del módulo específico, 17% fiebre amarilla) y 3644 antipalúdicos, la mayoría a personal militar (64%) (Guardia Civil y personal civil, 18% respectivamente). Los meses de más afluencia han sido Junio (17%) y Julio (10%). Se han atendido a 3016 pacientes, el 84% varones, y el 70% entre 30 y 50 años. La mayoría se han desplazado a misiones internacionales (81%): Afganistán (45%), Mali (15,4%) y Senegal (14,1), siendo el periodo de estancia más frecuente 180 días (23%). El 50% acuden al CVI sin tiempo suficiente para ser vacunado correctamente (menos de 30 días antes del inicio de la misión). La atovaquona-proguanil ha sido la quimioprofilaxis antipalúdica más recomendada (65.1%).



## CONCLUSIONES

- Desde su creación el CVI ha evolucionado adaptándose a las necesidades de las FAS.
- Casi una tercera parte de las vacunas administradas en el CVI corresponden al módulo básico (vacunas que deben ser administradas en sus unidades) este hecho puede interferir en la correcta administración de las vacunas del módulo específico.
- No acudir con tiempo suficiente al CVI puede suponer no alcanzar los niveles adecuados de inmunidad.